Benoril®

Diosmina + Hesperidina

Capleta

COMPOSICIÓN:
Cada capleta contiene:
Diosmina micronizada y purificada.....450.00 mg
Hesperidina micronizada y purificada.....50.00 mg
Excipientes c.s.p.....1 Capleta

DESCRIPCIÓN
Benoril® es un medicamento venotónico: aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos).

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
El mecanismo de acción de Benoril®: Disminuye el problema de la insuficiencia venosa crónica al prolongar la actividad de la noradrenalina sobre la túnica muscular venosa, logrando acortar el tiempo de vaciado, disminuir la distensibilidad y capacidad venosa.
La acción de Benoril® sobre la microcirculación: Mejora la perfusión tisular inhibiendo la síntesis de los radicales libres y protegiendo al tejido en contra de sus efectos. Ejerce un efecto inhibidor sobre la síntesis de las prostaglandinas PGE2, PGF2alfa y tromboxano, así como también inhibe la reacción de degradación del AMP cíclico por la fosfodiesterasa y actúa sobre las formas reactivas del oxígeno producidas por los polimorfonucleares.

INDICACIONES
Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, orgánica y funcional de los miembros inferiores, que se manifiesta por los siguientes síntomas: Pesadez, dolor, calambres nocturnos. Tratamiento de hemorroides y de los signos funcionales ligados a las crisis hemorroidales, como son: dolor, tenesmo, prurito, edema, rubor, sangrado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No utilizar de forma prolongada sin control médico.
Benoril® no está dirigido al uso en niños y adolescentes (menores de 18 años).
Si está embarazada o en período de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene la intención de quedarse embrazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la formula y lactancia.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Benoril® durante el embarazo. No se recomienda la lactancia durante el tratamiento por la ausencia de datos sobre la excreción del medicamento en leche materna.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS
No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducción y uso de máquinas con Benoril®.

INTERACCIONES
No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

POSOLOGÍA
Adultos:
Insuficiencia venosa: La dosis recomendada es de 2 comprimidos al día, repartidos en dos tomas, un comprimido al medio día y otro por la noche, con las comidas.
El alivio de los síntomas se produce, habitualmente, en las primeras 2 semanas de tratamiento.
Si no siente alivio a las 2 semanas o los síntomas empeoran, debe consultar al médico.
Por indicación del médico se puede continuar el tratamiento con la misma dosis diaria (2 comprimidos diarios) hasta 2-3 meses.
Crisis hemorroidales: Seis comprimidos durante cuatro días (dos comprimidos cada 8 horas), seguido de cuatro comprimidos durante tres días (dos comprimidos cada 12 horas); luego la dosis habitual de mantenimiento de dos comprimidos diarios según criterio médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
- Frecuentes (menos de 1 de cada 10 pero más de 1 de cada 100): trastornos gastrointestinales (diarrea, indigestión, náuseas, vómitos).
- Poco Frecuentes (menos de 1 de cada 100 pero más de 1 de cada 1.000): colitis.
- Raros (menos de 1 de cada 1.000 pero más de 1 de cada 10.000): trastornos del sistema nervioso (mareos, dolor de cabeza, malestar) y reacciones cutáneas (erupción cutánea, prurito, urticaria).
- Frecuencia no conocida: dolor abdominal, edema aislado de la cara, labios y párpados (hinchazón). Excepcionalmente edema de Quincke (hinchazón rápida de tejidos tales como la cara, labios, boca, lengua o garganta que pueden causar dificultad para respirar).

Estos efectos adversos se han notificado sin necesidad de interrumpir el tratamiento.

MANEJO DE SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Existe experiencia limitada de sobredosis, pero los síntomas notificados incluyen diarrea, náuseas, dolor abdominal, prurito y erupción cutánea. Se aplicará tratamiento según sintomatología.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN
Benoril®: Caja con 30 Capletas.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana.

Información actualizada, octubre 2020

A-401505 R.3