Coriarten® A

Candesartán-Amlodipina

Tabletas (Corabletas)

COMPOSICIÓN
Cada tableta (corableta) contiene:
Candesartán Cilexetil….....16 mg
Amlodipina Besilato equivalente a Amlodipina base.....5 mg
Excipientes, c.s.p…….....1 tableta (corableta)

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antihipertensivo

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Candesartán cilexetilo es un profármaco que se convierte rápidamente en el fármaco activo, candesartán. Candesartán es un antagonista de los receptores de angiotensina II, selectivo para receptores AT1 con fuerte afinidad y lenta disociación del receptor.

Amlodipina es un potente vasodilatador periférico, similar a la nifedipina y otro miembro de la clase de las dihidropiridinas, siendo la amlodipina la que tiene mayor vida media del grupo, esto permite la administración en una sola dosis; al reducir la concentración de calcio intracelular, en las células del músculo liso vascular y en las células cardíacas, se dilatan las arterias coronarias, las arterias y arteriolas periféricas, y esto produce descenso en las cifras tensionales, disminuye la contractilidad miocárdica (efecto inotrópico negativo y hace más lenta la conducción) nodal aurículo-ventricular (AV).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

INDICACIONES
Coriarten®A está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial cuando la monoterapia no es suficiente para obtener las cifras tensionales deseadas.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
Durante el embarazo y en mujeres en periodo de lactancia.
Insuficiencia renal severa (depuración de creatinina < 30 ml/min).
Insuficiencia hepática severa y/o colestasis y gota.

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos secundarios más comunes fueron leves y transitorios como son: Hipotensión, cefaleas, edema en miembros inferiores, náuseas, dolor abdominal, rubor, fatiga, palpitaciones y mareos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se debe administrar con precaución en los pacientes con hipovolemia, incluyendo los pacientes tratados con altas dosis de diuréticos. Puede exacerbar los efectos hipotensores de los anestésicos generales en los pacientes sometidos a cirugía general, y se deberá utilizar en estos casos con precaución.
Debido a la amlodipina, debe emplearse con precaución en pacientes con disfunción hepática, ya que la vida media del medicamento es prolongada en estos pacientes.
Debido al candesartán, debe monitorearse los electrolitos séricos y la creatinina. No se use con sales de litio ni diuréticos ahorradores de potasio. Evite usarlo en los estados de hipotensión arterial y en falla cardíaca aguda.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: Los fármacos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina, cuando se usan durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, pueden causar daño y muerte del feto y/o neonato.

Estudios en animales con candesartán cilexetilo han demostrado daños tardíos fetales y en neonatos en los riñones. En humanos, la perfusión renal fetal, dependiente del desarrollo del sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza en el segundo trimestre.
La amlodipina es clasificada categoría C en el embarazo. Esta ha demostrado ser feto-tóxica en animales de laboratorio.

Coriarten® A no debe usarse durante el embarazo. Si el embarazo es detectado durante el tratamiento, debe ser suspendido, e informar a la madre sobre los posibles riesgos.

Lactancia: Debido al potencial de los efectos adversos en el lactante, la alimentación materna debe suspenderse si se considera esencial el uso de **Coriarten® A.**

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Coriarten®A puede incrementar los efectos hipotensores de otros fármacos antihipertensivos o de los diuréticos cuando se administran concomitantemente.

DOSIS
Salvo criterio médico.
Hipertensión arterial: La dosis recomendada para el inicio del tratamiento y mantenimiento es 1 tableta (corableta) de **Coriarten® A** una vez al día. El máximo efecto antihipertensivo se obtiene en el lapso de cuatro semanas después de iniciar el tratamiento.
En pacientes que inician con **Coriarten® A** y que no logren un óptimo control de la presión arterial o que requieren reducción adicional de la presión arterial, se podría aumentar la dosis hasta un máximo de 2 tabletas (corabletas) al día.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Síntomas: Con base en las consideraciones farmacológicas, es probable que la hipotensión, vértigo y las palpitaciones sean las principales manifestaciones de una sobredosis con **Coriarten®A.**

Manejo: Si se presenta hipotensión sintomática, se debe establecer un tratamiento sintomático y monitoreo de los signos vitales. El paciente debe ser colocado en posición supina con las piernas elevadas. Si esto no es suficiente, se debe aumentar el volumen plasmático, con solución salina isotónica. Pueden administrarse fármacos simpaticomiméticos si las medidas descritas no son suficientes.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica.
Literatura exclusiva para médicos.
No se use después de su fecha de caducidad.
Este medicamento cumple con todos los requisitos de la c.G.M.P. y la FDA.

PRESENTACIÓN
Coriarten® A: Caja conteniendo 30 tabletas (corabletas)

ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL
República Dominicana

Información actualizada, noviembre 2021.

A-401501 R.2