Lecordius®

Lercanidipina HCl

Tableta (Corableta)

COMPOSICIÓN:
Cada tableta (corableta) de **Lecordius®10** contiene:
Lercanidipina HCl.....10 mg
Excipientes, c.s.p.....1 tableta (corableta)

Cada tableta (corableta) de **Lecordius®20** contiene:
Lercanidipina HCl.....20 mg
Excipientes, c.s.p.....1 tableta (corableta)

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antihipertensivo

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Lecordius® es un antagonista del calcio del grupo de las dihidropiridinas que inhibe el flujo de entrada del calcio a través de la membrana al músculo liso y cardíaco. El mecanismo de su acción antihipertensiva se debe a un efecto relajante directo sobre el músculo liso vascular, reduciendo la resistencia periférica total.

INDICACIONES
Lecordius® está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica de leve a moderada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico

Hipertensión: La dosis recomendada es de 10 mg por vía oral, una vez al día, por lo menos 15 minutos antes de las comidas; la dosis puede incrementarse a 20 mg dependiendo de la respuesta individual del paciente.
El aumento de la dosis debe ser gradual ya que pueden transcurrir aproximadamente 2 semanas hasta que se manifieste el efecto antihipertensivo máximo.

Algunos individuos no controlados adecuadamente con un solo agente antihipertensivo pueden beneficiarse de la adición de lercanidipina a la terapia con un medicamento bloqueante de los receptores beta-adrenérgicos, un diurético (hidroclorotiazida) o un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina.

Pacientes de edad avanzada:
Si bien los datos farmacocinéticos y la experiencia clínica sugieren que no se requiere hacer ajustes en la dosificación diaria, se debe tener especial cuidado cuando se inicia el tratamiento en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a lercanidipina o a cualquier componente de la fórmula.
Insuficiencia cardiaca no controlada, estenosis aórtica o sub-aórtica. No se recomienda su uso en pacientes con trastornos hepáticos o renales severos.

Población Pediátrica:
No se recomienda el uso de lercanidipina en niños y adolescentes menores de 18 años ya que no existe experiencia clínica con estos pacientes.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Lecordius® No se recomienda su uso durante estos periodos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Insuficiencia renal o hepática:
Se debe tener especial cuidado al iniciar el tratamiento en pacientes con disfunción renal o hepática leve o moderada. Si bien la posología normalmente recomendada puede ser tolerada por estos subgrupos, se debe tener precaución al aumentar la dosis a 20 mg al día. El efecto antihipertensivo puede incrementarse en pacientes con insuficiencia hepática y, en consecuencia, debe considerarse un ajuste de la dosis. No se recomienda el uso de lercanidipina en pacientes con insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min).

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia en los ensayos clínicos controlados son: Cefalea, mareos, edema periférico, taquicardia, palpitaciones, sofocos, ocurriendo en menos del 1% de los pacientes.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los pacientes medicados simultáneamente con cimetidina (en dosis mayores de 800 mg/día), digoxina o midazolam, pueden necesitar observación durante el tratamiento con lercanidipina.

Precaución con los siguientes fármacos:
Rifampicina, terfenadina, astemizol, amiodarona, quinidina, propanolol, metoprolol, anticonvulsivantes (como fenitoína o carbamazepina). Debe evitarse la co-prescripción de lercanidipina con antifúngicos orales, antibióticos macrólidos, antivirales (como ritonavir) y con medicamentos que contengan ciclosporina. El jugo de toronja puede acentuar el efecto de lercanidipina y, por lo tanto, debe ser evitado.

SOBREDOSIFICACIÓN E INGESTA ACCIDENTAL
Es de esperar que una sobredosis produzca vasodilatación periférica excesiva con una marcada hipotensión y taquicardia refleja. En caso de hipotensión grave, bradicardia y pérdida de conocimiento podría resultar de ayuda un apoyo cardiovascular mediante la administración de atropina intravenosa para la bradicardia.
Manejo: Carbón activado, si es necesario inducción de vómito o lavado gástrico. Si se presenta hipotensión severa, debe implementarse tratamiento sintomático.

No se tiene información sobre el valor de la diálisis. Debido a que el principio activo es altamente lipofílico es muy probable que sus concentraciones plasmáticas no sean una buena guía para determinar la duración del período de riesgo y la diálisis puede no resultar eficaz.

En vista del efecto farmacológico prolongado de lercanidipina, es esencial que el estado cardiovascular de los pacientes que tomen una sobredosis se controle durante al menos 24 horas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
-Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
-Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
-Su venta requiere prescripción médica.

PRESENTACIONES
Lecordius®10: Caja conteniendo 30 tabletas (corabletas).
Lecordius®20: Caja conteniendo 30 tabletas (corabletas).

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, agosto 2019

A-401816 R.1