Presiten®D

Lisinopril-Hidroclorotiazida

Tableta (Corableta)

Anti-hipertensivo
Inhibidor enzima convertidora angiotensina + Diurético

COMPOSICIÓN
Cada tableta (corableta) contiene:
Lisinopril.....20 mg
Hidroclorotiazida.....25 mg
Excipientes, c.s.p.....1 tableta (corableta)

FARMACOLOGÍA
Presiten®D es un medicamento que contiene la asociación de dos sustancias (Lisinopril e Hidroclorotiazida) que han demostrado ser sumamente eficaces en la disminución de la presión arterial por dos mecanismos de acción distintos.

El único inhibidor de la ECA que verdaderamente actúa durante 24 horas con una sola dosis.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Presiten®D está indicado en el tratamiento de la hipertensión esencial y de la hipertensión renovascular. En el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva que no haya sido controlada adecuadamente por el tratamiento con digitálicos.

Presiten®D es útil en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva, no controlada adecuadamente, con digitálicos y/o diuréticos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del **Presiten®D** y en pacientes con antecedentes de edema angio-neurótico relacionado con tratamiento previo con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.

Debido a la hidroclorotiazida, la glomerulonefritis aguda es una contraindicación absoluta, insuficiencia renal (Glomerulonefritis o pielonefritis crónica hipertensión maligna) con una concentración de urea sanguínea mayor de 80 mg/100ml. Anuria.

Uso en embarazo y lactancia:
No debe ser utilizado. Unicamente cuando el médico juzgue que el beneficio potencial justifica el riesgo.

INTERACCIONES
1. Diuréticos. Estos pueden potencializar el efecto antihipertensivo.
2. Indometacina. La administración concomitante puede ocasionar una disminución en la eficacia de **Presiten®D**.
3. Sales de Litio. El **Presiten®D** puede disminuir la excreción de litio; por tanto si se administran simultáneamente, se deben vigilar estas concentraciones en el suero.
4. Potasio sérico. Normalmente éstos se mantienen dentro de los límites normales

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
La dosis de mantenimiento eficaz y usual es de una corableta al día, y en una sola toma. Dosificación debe ser ajustada según la respuesta de cada paciente. Si existe riesgo de hipotensión sintomática, como en los casos de déficit de sal con o sin hiponatremia, de hipovolemia, o de tratamiento diurético intenso, si es posible esas condiciones deben corregirse antes de iniciar el tratamiento con **Presiten®D** y debe vigilarse el efecto de la dosis inicial sobre la presión arterial.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

REACCIONES SECUNDARIAS
Presiten®D es muy bien tolerado en la mayoría de los casos, siendo los efectos indeseables, leves y transitorios.
Los efectos secundarios más comunes son: mareos, cefaleas, diarrea, fatiga y náuseas.
Se ha notificado de la aparición de tos con el uso de inhibidores de la ECA, la cual tiene características de ser no productiva y persistente, la cual desaparece al suspender el medicamento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Estrechamiento de las arterias, problemas cerebrovasculares tales como un infarto o un ataque isquémico transitorio (AIT, un pequeño accidente cerebrovascular), fallo cardiaco, tensión sanguínea baja, o una dieta restringida en sal o está tomando diuréticos. Niveles anormales de agua y minerales en su cuerpo (desequilibrio de fluidos/electrolítico), enfermedad del músculo cardiaco (cardiomiopatía hipertrófica), un estrechamiento de la arteria principal que transporta sangre desde el corazón, la aorta (estenosis aórtica), u otras formas de un problema cardiaco llamado obstrucción del flujo de salida.
Se debe tener en cuenta si padece diabetes, si está tomando alguno de los siguientes medicamentos utilizados para tratar la hipertensión: un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA) o aliskirén, inmunosupresores, alopurinol o anestésicos.
Vómitos prolongados y/o diarrea grave. Si van a realizarle un test de funcionalidad de su glándula paratiroidea.
Problemas hepáticos o renales, enfermedad vascular del colágeno, tal como lupus eritematoso sistémico (SLE) o esclerodermia, que puede estar asociada a erupciones cutáneas, dolor de articulaciones y fiebre, problemas alérgicos o asma.
Si está en tratamiento con otros diuréticos: se debe interrumpir 2-3 días antes si va a comenzar el tratamiento con lisinopril/hidroclorotiazida.

MANEJO DE SOBREDOSIFICACIÓN:
No existe información específica acerca del tratamiento de la sobredosis con lisinopril/hidroclorotiazida. El tratamiento es sintomático y de soporte. La administración del medicamento debe interrumpirse inmediatamente y el paciente debe mantenerse en estrecha observación. El tratamiento se determina por la gravedad y naturaleza de los síntomas. Deberán tomarse medidas adecuadas para prevenir la absorción y acelerar la eliminación. Las medidas recomendadas incluyen inducción del vómito y/o lavado gástrico, si la ingestión es reciente, y corrección de la deshidratación, balance electrolítico e hipotensión mediante los procedimientos establecidos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar.

PRESENTACIÓN
PRESITEN®D: Caja conteniendo 30 corabletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
- Literatura exclusiva para médicos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, septiembre 2018

A-400891 R.3