

**DOSIS**

Salvo un mejor criterio del médico, las dosis que se recomiendan son:

**Solución Oral:**

**Adultos y niños mayores de 12 años:** Una y media a dos cucharaditas (7.5 - 10 mL) dos o tres veces al día.

**Niños de 6 - 12 años:** Una y media cucharadita (7.5 mL) dos veces al día.

**Niños de 4 - 6 años:** Una cucharadita (5 mL) dos veces al día.

**Niños menores (8 meses - 4 años):** 1/2 cucharadita (2.5 mL) dos veces al día.

**Cápsulas:**

**Adultos:** 1 cápsula cada 12 horas.

**PRESENTACIONES**

**Brondil Compositum:** Caja con frasco de 120 mL.

**Brondil Compositum:** Caja conteniendo 20 cápsulas.

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en un lugar fresco y seco (no más de 30°C).

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN**

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños

Su venta requiere receta médica.

Literatura exclusiva para médicos.

No se use después de su fecha de caducidad.

Este medicamento cumple con todos los requisitos de la c.G.M.P. y la FDA.

**Elaborado por:**

Laboratorio Magnachem International, SRL.

República Dominicana.

Información actualizada, junio 2017.

A-400822 R.1

# Brondil®

compositum

Ambroxol + Clenbuterol

**Jarabe-Cápsulas****COMPOSICIÓN**

Cada 5 mL de solución contienen:

Ambroxol HCl.....	7.5 mg
Clenbuterol.....	0.005 mg
Vehículo c.s.p.....	5 mL

**Cada cápsula contiene:**

Ambroxol HCl.....	30 mg
Clenbuterol.....	0.02 mg
Excipientes c.s.p.....	1 Cápsula

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Mucolítico-Broncodilatador

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA**

**BRONDIL COMPOSITUM** asocia dos sustancias de reconocida acción sobre las vías respiratorias: El ambroxol y el Clenbuterol.

El ambroxol se caracteriza por ejercer acciones secretolíticas y secretomotoras, ya que además de fluidificar la secreción viscosa y adherente, activa el mecanismo de depuración mucociliar, esto se produce al estimular la síntesis del surfactante bronquial y al mismo tiempo acelerar la frecuencia vibrátil del epitelio ciliar, mejorando la estabilidad y el transporte de las secreciones a nivel bronquial, disminuye además la fuerza de adhesividad de las mismas en las vías respiratorias de mayor calibre.

Al combinarse con el clenbuterol se le suman a los efectos beneficiosos antes nombrados, un efecto broncodilatador altamente selectivo, que suprime el broncoespasmo y por tanto los estertores, las sibilancias y la disnea.

**INDICACIONES**

**BRONDIL COMPOSITUM** está indicado para el tratamiento de los procesos broncopulmonares especialmente los que cursan con aumento de la viscosidad de las secreciones bronquiales acompañado de tos persistente y molesta, como: Bronquitis aguda y crónica, bronquitis asmática, asma Bronquial y afecciones pulmonares infecciosas que en general cursan con retención de secreciones y broncoespasmo.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Estenosis sub-valvular aórtica idiopática, tirotoxicosis, taqui-arritmia, primer trimestre del embarazo.

**PRECAUCIONES**

Es muy importante no tomar más cantidad que la recomendada, salvo prescripción facultativa; los niños no tomarán más de la dosis indicada por el médico. Si el tratamiento prescrito es a largo plazo o a dosis elevadas, se debe visitar regularmente al médico para comprobar su evolución.

**Uso durante el embarazo:**

El uso de **BRONDIL COMPOSITUM** durante el embarazo debe tomar en cuenta posibles beneficios versus riesgos.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Se puede desarrollar una discreta sensación de temblor o inquietud. Se presenta al inicio del tratamiento y en estos casos se recomienda disminuir la dosis. Además en pacientes sensibles se puede presentar temblor en los dedos, palpitaciones y en muy raras ocasiones trastornos gastrointestinales como diarrea leve, náuseas o vómitos y reacciones alérgicas.

COLOR (ES):  
Negro

MATERIAL:  
Papel Bond Blanco Calibre 20

7.25"

4.25"