

# Colixal®

Propinox HCl

Solución Oral Gotas



## COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de **Colixal®gotas** contiene:

Propinox HCl.....10 mg  
Vehículo, c.s.p.....1 mL

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiespasmódico

## INDICACIONES

**Colixal®** está indicado en el tratamiento del espasmo agudo del tracto gastrointestinal. Espasmo y disquinesia biliar. Espasmo del tracto genitourinario.

## VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

## POSOLÓGIA

*Salvo criterio médico*

Lactantes y menores de 1 año: 1 gota, cada 6 - 8 horas.

Niños de 1 - 10 años: 1-2 gotas por cada año de edad, cada 6 - 8 horas.

Adultos y niños mayores de 10 años: 20 gotas, cada 6 - 8 horas.

## CONTRAINDICACIONES

Su administración no requiere precauciones especiales, salvo en pacientes con las siguientes condiciones: Retención urinaria debido a enfermedades prostáticas, glaucoma y estenosis pilórica.

## REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

El producto es bien tolerado y en las dosis propuestas, carece de efectos secundarios. En pacientes particularmente sensibles, al administrar dosis altas, puede aparecer: Sequedad de boca o constipación, los cuales tienden a desaparecer al disminuir la dosis.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN

- Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar fresco y seco (no más de 30°C), protegido de la luz.
- Su venta requiere prescripción médica.

## PRESENTACIÓN

**Colixal gotas:** Caja conteniendo 1 Frasco gotero x 20 mL.

## Elaborado por:

Laboratorio Magnachem International, S.R.L.  
República Dominicana.

Información actualizada, marzo 2016

A-401695 R.0