Movix®

Meloxicam

Tableta

COMPOSICIÓN
Movix® 15
Cada tableta contiene:
Meloxicam .....15 mg
Excipientes, c.s.p. .....1 tableta

ACCION TERAPÉUTICA
Antiinflamatorios y antirreumáticos, no esteroideos; oxicams. Código ATC: M01AC06.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Movix® está indicado en patologías inflamatorias dolorosas o degenerativas causadas por artritis reumatóidea, osteoartitris, tendinitis, bursitis; así como también cualquier proceso inflamatorio agudo, doloroso o crónico. Tratamiento sintomático de corta duración de las crisis agudas de osteoartritis. Tratamiento sintomático a largo plazo de la artritis reumatoide (poliartritis crónica). Tratamiento sintomático de la espondilitis anquilosante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico
Se recomienda una tableta de 15 mg en una sola toma diaria, puede usar menores dosis (7.5mg), según criterio médico.
La dosis total diaria debe administrarse en una sola toma, tragar con agua u otro líquido.

CONTRAINDICACIONES
Movix® está contraindicado en pacientes con úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia hepática o renal severa.
Madres que se encuentran lactando ya que atraviesa la leche materna. Pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad al fármaco o asma, angioedema, urticaria o cualquier reacción relacionada a los antiinflamatorios no esteroidales (AINE). Pacientes menores de 18 años.
Antecedentes de hemorragia cerebrovascular u otros trastornos hemorrágicos; insuficiencia cardíaca grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Movix® debe ser administrado con precaución en pacientes con antecedentes de dolencias gastrointestinales o que beben anticoagulantes orales. En pacientes con insuficiencia renal o que se encuentren sometidos a hemodiálisis, la dosis no debe superar los 7.5 mg al día.
El riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es mayor con el incremento de las dosis de AINE, en pacientes con antecedentes de úlcera, particularmente si se complica con hemorragia o perforación y en pacientes de edad avanzada.
No debe excederse la dosis diaria máxima recomendada en caso de un efecto terapéutico insuficiente, ni debe añadirse un AINE adicional al tratamiento porque ello podría incrementar la toxicidad y no se ha demostrado un beneficio terapéutico.
Meloxicam no es apropiado para el tratamiento de pacientes que requieran un alivio del dolor agudo.
En ausencia de mejora tras algunos días, debe reevaluarse el beneficio clínico del tratamiento.
Los pacientes con antecedentes de hipertensión y/o insuficiencia cardiaca congestiva de leve a moderada requieren monitorización y consejo adecuado ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema en asociación con el tratamiento con AINE.
Se recomienda una monitorización clínica de la presión arterial en pacientes de riesgo antes de iniciar el tratamiento con meloxicam y especialmente durante el inicio de este.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo.
Lactancia: aunque no existe experiencia específica con meloxicam, se sabe que los AINE pasan a la leche materna. Por lo tanto, no se recomienda la administración en mujeres en fase de lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Efecto sinérgico con: otros AINE, incluyendo ácido acetilsalicílico (AAS) > 3 g/día.
Riesgo aumentado de hemorragia con: anticoagulantes orales, trombolíticos y antiagregantes plaquetarios.
Reduce el efecto de: diuréticos y otros antihipertensivos.
Disminuye efecto antihipertensivo de: ß-bloqueantes.
Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina, tacrolimús.
Disminuye eficacia de: dispositivos intrauterinos. Incrementa toxicidad de: litio, metotrexato (> de 15 mg/semana, no recomendable, dosis inferiores monitorizar el hemograma y la función renal).
Eliminación acelerada por: colestiramina.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas que a continuación se describen se han clasificado atendiendo a la frecuencia de aparición:
Poco frecuente: Anemia, Reacciones alérgicas distintas a las reacciones anafilácticas o anafilactoides, Mareo, somnolencia, Aumento de la presión arterial, hemorragias gastrointestinales ocultas o macroscópicas, estomatitis, gastritis, eructos, alteración de la función hepática (ej. Aumento de transaminasas o bilirrubina), Angioedema, prurito, exantema, Retención de sodio y agua, hiperpotasemia, Edema incluyendo edema de los miembros inferiores.
Muy frecuente: Trastornos gastrointestinales como dispepsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, diarrea.
Frecuentes: Cefaleas,
Raras: Recuento celular sanguíneo alterado (incluyendo diferencias en recuento de los glóbulos blancos), leucocitopenia, trombocitopenia, Alteraciones del estado de ánimo, pesadillas, Alteraciones visuales incluyendo visión borrosa, conjuntivitis, Acúfenos, Palpitaciones Se ha notificado casos de insuficiencia cardiaca asociada al tratamiento con AINE, Asma en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico o a otros AINE, colitis, úlcera gastroduodenal, esofagitis, Síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, urticaria,
Muy raras: agranulocitosis, Hepatitis, Dermatitis vesicular, eritema multiforme, Insuficiencia renal aguda especialmente en pacientes con factores de riesgo,
Frecuencia no conocida: Reacción anafiláctica, reacción anafilactoide, Estados de confusión, desorientación, Vértigo, Pancreatitis, Reacción de fotosensibilidad, exantema fijo medicamentoso.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
No se ha relacionado ningún tipo de intoxicación por debajo de 15 mg al día. Se recomienda notificar al médico de inmediato si se presenta cualquier tipo de efecto indeseable durante el uso de este medicamento. Se recomienda, suspender el tratamiento, inducir al paciente al vómito y lavado gástrico en caso de ser necesario.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 10 y 50 tabletas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
No se use después de su fecha de caducidad.
No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, junio 2025
A-400882 R.4