Tussichem®

Dextrometorfano HBr
Clorfeniramina Maleato

Magnachem®
Salud y Vida

Solución Oral

COMPOSICIÓN
Cada 5 mL contiene:
Dextrometorfano HBr.....15 mg
Clorfeniramina Maleato..... 2 mg
Vehículo, c.s.p.....5 mL

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antialérgico, antagonista del receptor H1 y antitusivo, código ATC: R06AB04 / R05DA09.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Alivia temporalmente la tos debido a la irritación leve de garganta y bronquios que puede ocurrir con un resfriado. secreción nasal, estornudos, picazón y lagrimeo en los ojos, picazón en la nariz o la garganta.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico
Adultos y niños mayores de 12 años: 5-10 mL cada 6 u 8 horas.
Niños de 6-11 años: 5 mL cada 8 horas.
No se recomienda su uso en recién nacidos.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática y renal, alergia a cualquiera de los componentes. Debe evaluarse la relación riesgo-beneficio en presencia de crisis de asma bronquial, obstrucción del cuello vesical, hipertrofia prostática sintomática, predisposición a retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo abierto. Pacientes que hayan recibido tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) en los últimos 14 días. Pacientes que estén recibiendo otros fármacos simpaticomiméticos o personas con o en riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se debe tener precaución en pacientes hipersensibles.
Si la tos persiste después de haber utilizado el medicamento durante 7 días o si con la tos se presenta fiebre elevada, rash cutáneo o cefalea constante, se reevaluará el tratamiento. Posible interferencia con las pruebas cutáneas que utilizan alérgenos. En caso de irritación gástrica puede tomarse con alimentos o agua. En niños mayores puede producirse una reacción paradójica, caracterizada por hiperexcitabilidad. En pacientes de edad avanzada es probable que aparezcan mareos, sedación, confusión, hipotensión, sequedad de boca y retención urinaria debido a que son más sensibles a los efectos antimuscarínicos. No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones. Asimismo, los pacientes bajo tratamiento deben abstenerse de conducir u operar con máquinas que requieran alerta mental.
La clorfeniramina no debe utilizarse con otros antihistamínicos. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp (trastorno genético poco común que impide a los bebés digerir la lactosa) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar preparados que contengan clorfeniramina.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos. No obstante, puede aceptarse la utilización de dextrometorfano hidrobromuro en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras, y siempre que los beneficios superen los posibles riesgos.
La clorfenamina, puede inhibir la lactación debido a sus acciones anticolinérgicas.
Lactancia: sólo debe ser utilizado en caso de que los beneficios superen los posibles riesgos.

NTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El alcohol, los antidepresivos tricíclicos y los depresores del SNC pueden potenciar los efectos depresores. Se potencian los efectos antimuscarínicos con el uso, en forma simultánea, de haloperidol, ipratropio, fenotiazinas o procainamida. Los IMAO pueden prolongar los efectos antimuscarínicos y depresores del SNC de la clorfenamina. Los inhibidores de la monoamino oxidasa juntamente con el dextrometorfano pueden producir excitación, hipotensión e hiperpirexia. Expectorantes y mucolíticos, la inhibición del reflejo de la tos podría dar lugar a una obstrucción pulmonar en caso de aumento del volumen o de la fluidez de las secreciones bronquiales.
No administrar juntamente con zumo de toronja o de naranja amarga, ya que pueden incrementar los niveles plasmáticos de dextrometorfano al actuar como inhibidores del citocromo P- 450 (CYP2D6 y CYP 3 A4).

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas que a continuación se describen se han clasificado atendiendo a la frecuencia de aparición:
Frecuentes: puede producir somnolencia, sequedad de nariz, garganta, espesamiento de las mucosidades, sequedad de boca, pérdida de apetito, alteraciones de gusto u olfato, molestias gastrointestinales (diarrea, estreñimiento) que se pueden reducir con la administración junto con alimentos.
Pocos frecuentes: acúfenos, laberintitis aguda, tensión en el pecho, sibilancias, hipotensión, hipertensión, edema, generalmente con sobredosis, arritmias cardiacas, palpitaciones, impotencia, adelantos en las menstruaciones.
Raras: mareos, náuseas o vómitos, gastralgias, taquicardia, anorexia, rash cutáneo, visión borrosa o cualquier cambio en la visión, pirosis, sudoración, agranulocitosis, trombocitopenia, alucinaciones visuales, confusión a las dosis recomendadas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Con dosis muy altas puede esperarse la aparición de depresión respiratoria. Signos de sobredosis: confusión, excitación, nerviosismo, inquietud o irritabilidad no habituales, torpeza, sequedad de boca o nariz, enrojecimiento de la cara, alucinaciones, crisis convulsivas, insomnio.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.
El tratamiento es sintomático incluyendo la inducción del vómito y el lavado gástrico. En caso de depresión respiratoria, administrar naloxona y asistencia respiratoria. Si se producen convulsiones, administrar benzodiazepinas por vía intravenosa o rectal, en función de la edad. Se puede administrar carbón activo a pacientes asintomáticos que hayan ingerido una sobredosis de dextrometorfano en la hora anterior. Para pacientes que han ingerido dextrometorfano y están sedados o en coma, se puede considerar, naloxona a las dosis habituales para el tratamiento de sobredosis de opiáceos. Se pueden usar benzodiacepinas para las convulsiones y benzodiacepinas y medidas de enfriamiento externo para la hipertermia por síndrome serotoninérgico.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un frasco de 120 mL + vaso dosificador.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30 ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
No se use después de su fecha de caducidad.
No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, octubre 2025
A-402462 R.2