Ergosonal®

Antimigrañoso

Tabletas recubiertas

Magnachem®
Salud y Vida

COMPOSICIÓN
Cada tableta recubierta contiene:

Tartrato de ergotamina	0.25 mg
Vitamina B1	5 mg
Cafeína pura	60 mg
Acetaminofén	250 mg
Excipientes, c.s.p.	1 tableta recubierta

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Medicamento antimigrañoso.

INDICACIONES
Ergosonal® está destinado al tratamiento de las crisis de migraña, con o sin aura, de intensidad moderada a severa.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Ergosonal® es un preparado antimigrañoso que asocia varias sustancias, como son: Un alcaloide del ergot, un vasoconstrictor, un analgésico no esteroide, y la acción de la vitamina neurotropa.

Ergotamina: Los efectos de la ergotamina, resultan de su acción agonista parcial sobre los receptores alfa adrenérgicos y serotoninérgicos a nivel vascular, contrayendo los vasos cerebrales relajados.

Cafeína: Co-adyuva el efecto de la vasoconstricción, manteniendo la tonificación a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales.

Acetaminofén: La acción analgésica del acetaminofén, se desarrolla por inhibición de la enzima ciclooxigenasa.

Vitamina B1 ó Tiamina: Su acción en la regeneración de las fibras nerviosas es importante, las cuales son afectadas en las crisis de migraña.

POSOLOGÍA
Adultos:
La dosis recomendada es de 1 o 2 tabletas al comienzo de la crisis. De ser necesario, si el dolor no cede en el transcurso de 1 hora, puede agregarse 1 tableta.
La dosis diaria total máxima es de 6 tabletas.
En ataques agudos tómese **Ergosonal®** inmediatamente.
Ingerir las tabletas enteras, sin partirlas, ni masticarlas y con abundante líquido.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Embarazo, Lactancia.
Enfermedad vascular periférica, enfermedad coronaria, hipertensión arterial.
Ulcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal. Antecedentes de manifestaciones alérgicas asociadas al ácido acetilsalicílico o a otros antiinflamatorios no esteroideos.

Embarazo
Contraindicado. Ergotamina: categoría X. Cafeína: categoría C. Paracetamol: categoría B.

Lactancia
La administración de la asociación ergotamina/cafeína/paracetamol está contraindicada durante la lactancia ya que excreta por la leche materna y puede causar vómitos, diarrea, pulso débil y presión arterial lábil en el niño.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Riesgo de vasoconstricción e isquemia con: otros preparados con ergotamina, triptanes, inhibidores de proteasa o transcriptasa inversa, macrólidos, sibutramina; asociación contraindicada.
Precaución con: ß- bloqueantes, dopamina, cloranfenicol.
Otros fármacos que se metabolizan por el CYP3A4 o con agentes vasopresores (incluyendo alcaloides del cornezuelo de centeno, sumatriptán y otros agonistas del receptor $5HT_1$.

PRECAUCIONES
Ergosonal® debe emplearse según la posología recomendada y extremando la precaución de no sobrepasar las dosis máximas diarias.

MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN
En caso de sobredosis, se pueden producir mareos, náuseas, vómitos y dolor abdominal, isquemia periférica, frialdad de manos y pies, taquicardia, cianosis, daño hepático con o sin insuficiencia renal, coma. **Tratamiento general de la sobredosis:** Lavado gástrico, administración oral de carbón activado, hemodiálisis y acetilcisteína en dosis adecuadas. Además, vasodilatadores y aspirina.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
- Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura no más de 30°C. Protéjase de la luz.
- Su venta requiere prescripción médica.

PRESENTACIÓN
Caja con 50 tabletas recubiertas.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana.

Información actualizada, octubre 2018
A-400850 R.2