Flexar®

Tiocolchicósido

Solución inyectable-Cápsula

Magnachem®
Salud y Vida

COMPOSICIÓN:
FLEXAR® 4 mg
Cada Ampolla de 2 mL contiene:
Tiocolchicósido..... 4 mg
Vehiculo c.s.p.....2 mL

FLEXAR® 8
Cada cápsula contiene:
Tiocolchicósido..... 8 mg
Excipientes, c.s.p.....1 cápsula

CARACTERÍSTICAS
Flexar® contiene como principio activo al tiocolchicósido, una molécula de síntesis derivada de un análogo azufrado de la colchicina que actúa como un relajante muscular a nivel central. El tiocolchicósido no tiene efecto curarizante, por lo tanto, no actúa a nivel de la placa motora, no altera la motilidad voluntaria y no provoca parálisis.

INDICACIONES
Tratamiento de las contracciones musculares dolorosas en: Afecciones vertebrales, degenerativas y espásticas: Tortícolis, dorsalgia, lumbalgia, ciática. Afecciones traumatológicas y neurológicas (espásticas). Rehabilitación funcional.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Solución inyectable: Intramuscular (I.M)
Cápsulas: Oral

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico
Intramuscular: La dosis inicial en adultos es de 8 mg; una ampolla de 4 mg 2 veces al día por 3 a 5 días.
Capsulas: La dosis inicial recomendada para contracturas musculares leves a moderadas es de 1 cápsula de 8 mg dos veces al día por 5 a 7 días.

Tratamiento de las agudizaciones o exacerbaciones severas: La dosificación puede irse incrementando progresivamente aumentándole a la dosis diaria la mitad de la dosis inicial cada dos días, hasta lograr un máximo de dos o, en casos excepcionales, tres veces la dosis inicial. En casos de contracturas severas puede aplicarse una inyección de 4 mg por 3 a 5 días y eventualmente continuar la administración por vía oral a dosis de 8 mg por 5 a 7 días.

Tratamiento de condiciones crónicas: La dosis inicial puede reducirse espaciando el intervalo entre las inyecciones (reducir a 1 o 2 inyecciones por semana o por mes), o reduciendo la dosis oral diaria progresivamente hasta llegar a 1 o 2 cápsulas al día o incluso cada 48 horas.

Para preparación de sesiones de fisioterapia: Considerar el tiempo necesario para obtenerse el efecto relajante:
- Inyección intramuscular: 1 inyección intramuscular 30 a 40 minutos antes de iniciar la sesión.
-Vía oral: 1 a 2 comprimidos 1 a 2 horas antes de iniciar la sesión.

La dosis oral máxima recomendada es de 8 mg cada 12 horas, es decir 16 mg al día. La duración del tratamiento debe limitarse a 7 días consecutivos.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de alergia al tiocolchicósido.
Antecedentes de ataque vasovagal después de la administración de este producto vía intramuscular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Utilizar en adultos y adolescentes a partir de los 16 años.
No se recomienda la administración a pacientes con antecedentes alérgicos (asma, eczema).
El tiocolchicósido puede precipitar ataques en pacientes con epilepsia o en aquellos pacientes con alto riesgo de padecerla.
Debido a que este producto contiene lactosa entre sus excipientes, los pacientes con intolerancia a lactosa deben consultar con el médico antes de tomar este medicamento.
Se debe tener especial cuidado en pacientes geriátricos con deterioro de la función renal y hepática. No debe utilizarse en tratamientos prolongados de enfermedades crónicas.

Embarazo y lactancia:
Aunque no se ha observado ninguna malformación en la fase de experimentación en animales, no se recomienda su uso durante el embarazo, ni durante el periodo de lactancia debido a que se excreta por la leche materna.

INTERACCIONES
No se han reportado interacciones con otros medicamentos.

EFECTOS SECUNDARIOS
Raramente, trastornos digestivos: diarreas, dispepsia. Parálisis flácida e hipotonía muscular.
Excepcionalmente: Reacciones alérgicas cutáneas. Reacciones anafilácticas como prurito, urticaria, angioedema, broncoespasmo o shock anafiláctico.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
La toxicidad del Tiocolchicósido es escasa y no se han reportado síntomas específicos de sobredosificación en pacientes tratados con Tiocolchicósido. En caso de sobredosificación se recomienda consultar con el médico tratante y aplicar medidas sintomáticas.

PRESENTACIÓN:
Flexar® 4mg - Solución inyectable: Caja con 5 Ampollas de 2 mL.
Flexar® 8 - Cápsulas: Caja conteniendo 10 cápsulas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura inferior a 30ºC en su envase original y protegido de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana.

A-402452 R.0