Metrisonal®

Maleato de Ergonovina

Tableta

COMPOSICIÓN
Cada tableta contiene:
Maleato de Ergonovina..... 0.2 mg
Excipientes, c.s.p.....1 tableta

INDICACIONES
La ergometrina está indicada en la prevención o en el tratamiento de la hemorragia uterina postparto o postaborto debida a la atonía o subinvolución uterinas. Su uso no se recomienda antes de la expulsión de la placenta, ya que puede producirse retención de ésta. En caso de aborto incompleto, la ergometrina puede utilizarse para acelerar la expulsión de los contenidos uterinos. También se utiliza como agente de diagnóstico de la angina de pecho variante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGIA
Salvo criterio médico
2 a 4 veces al día (cada 6 o 12 horas) hasta que el peligro de atonía uterina o hemorragia haya concluido, generalmente durante 48 horas.

CONTRAINDICACIONES
Toxemia, hipertensión, amenaza de aborto espontáneo. Inducción del parto, lactancia. Enfermedad de las arterias coronarias. Disfunción hepática. Disfunción renal. Hipocalcemia. Enfermedad vascular oclusiva periférica. Sepsis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No es recomendable el uso rutinario antes de la expulsión de la placenta.
Todos los agentes oxitócicos son potencialmente peligrosos y su uso inadecuado puede ocasionar daños tanto en la madre como en el niño. La hiperestimulación del útero durante el trabajo de parto puede llevar a la tetanización del órgano con deterioro de la circulación uteroplacentaria, ruptura uterina, laceraciones cervicales y perineales, embolismo del líquido amniótico y daño al neonato (hipoxia, hemorragia intracraneal). Debido a la peligrosidad de una sobredosis, los agentes oxitócicos deben ser administrados bajo estricta vigilancia médica. Debido a la hipertonía muscular uterina producida por la ergonovina, no se recomienda su uso rutinario previo al parto. Su uso prolongado debe ser evitado y suspendido si aparecen síntomas de intoxicación por alcaloides del cornezuelo de centeno. Debe ser utilizada con cautela y cuando su uso esté plenamente justificado en los pacientes con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, estenosis de la válvula mitral, enfermedades vasculares oclusivas, shunts venoarteriales, patologías de la arteria coronaria, disminución de la función hepática, hipocalcemia, insuficiencia renal y sepsis. El tipo y la cantidad de la hemorragia post-partum, deben ser controlados, así como la presión arterial, el pulso y la respuesta uterina.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: está contraindicado en el embarazo, y no debe ser administrada durante el trabajo de parto y antes de la expulsión de la placenta.

Lactancia: Problemas en humanos no han sido documentados, sin embargo, los alcaloides del cornezuelo de centeno se excretan en la leche. Pueden causar un envenamiento crónico en el infante, si se utilizan a dosis más altas que las recomendadas o por períodos mayores de los aconsejados.

INTERACCIONES
Anestésicos generales (halotano), nitroglicerina u otros agentes antianginosos, bromocriptina u otros alcaloides del cornezuelo de centeno, nicotina, vasoconstrictores o vasopresores.

EFECTOS SECUNDARIOS
Dado que la administración de ergonovina sólo implica pocas dosis en un período corto, no se producen muchas reacciones adversas observadas con otros alcaloides del cornezuelo de centeno. Puede producir un efecto hipertensor severo y repentino asociado con toxemia gravídica y antecedentes de hipertensión.
De incidencia menos frecuente: dolor en el pecho, cefalea súbita y severa, prurito, calambres, náuseas, vómitos, confusión.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Signos y síntomas: Los síntomas pueden comenzar luego de unos minutos de la administración de una sobredosis de alcaloides del cornezuelo de centeno e incluyen náuseas, vómitos, cefaleas, diarreas y en mujeres espasmos uterinos. Otros síntomas son: bradicardia, confusión, visión borrosa, pulso débil, miosis, vasoconstricción periférica severa y pérdida del conocimiento. En neonatos, se han reportado depresión respiratoria, cianosis y convulsiones. Severos síntomas de angina de pecho, isquemia cardiaca, infarto de miocardio y muerte pueden ocurrir en pacientes con enfermedad de la arteria coronaria. Los síntomas de una sobredosis crónica son: parestesias, extremidades frías o insensibles, gangrena de los dedos de las manos, pantorrillas o pies, hemiplejías, tromboflebitis e hipercoagulabilidad.

Tratamiento: No hay un antídoto específico, simplemente se pueden tratar los síntomas con terapia de soporte que incluye: discontinuar inmediatamente la droga en caso de administración oral, descontaminación con múltiples dosis de carbón activado y un catártico apropiado. Los lavados gástricos pueden ser considerados. Monitoreo de los signos vitales, gases en sangre y electrolitos. Monitoreo electrocardiográfico, tratamiento con nitroglicerina de la isquemia miocárdica. Uso de diazepam o fenitoína para tratamiento de los dolores. Uso de nitroprusiato, tolazolina o fentolamina para tratamiento de la isquemia periférica e hidralazina o clopromazina 15 mg. para el tratamiento de la hipertensión severa.

PRESENTACIÓN
Caja con 20 tabletas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura no más de 30ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Su venta requiere receta médica.
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, mayo 2019.

A-400879 R.2