# Noberol® FORTE

Acetaminofén + Carisoprodol
Capletas

**COMPOSICIÓN**
Cada capleta contiene:
Acetaminofén ..... 500.00 mg
Carisoprodol.....175.00 mg
Excipientes, c.s.p.....1 capleta

**INDICACIÓN**
Está indicado para el tratamiento de todo proceso doloroso, contracturas musculares, lumbalgia, síndrome del disco intervertebral, artritis, artrosis, artralgias, tendinitis, bursitis, sinovitis, tortículis, calambres, luxaciones, esguinces, así como en el post-operatorio en traumatología y ortopedia.

**POSOLOGÍA**
Pacientes mayores de 12 años 1 capleta cada 8 horas.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**CONTRAINDICACIONES**
Antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Leucopenias, trombocitopenias.

**PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS**
Pacientes sensibles al carisoprodol puede producir somnolencia o fatiga, por lo cual se recomienda tener cuidado al conducir automóviles o máquinas peligrosas. En raros casos de intoxicación por sobredosis, podria presentarse un cuadro de necrosis hepática y renal.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS**
Se pueden presentar, en muy raras oportunidades, reacciones cutáneas como erupciones, alteraciones hemáticas o nefrotoxicidad.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**
La administración de Carisoprodol junto con otros medicamentos narcóticos o con barbitúricos puede potenciar el efecto de estos.

- Probenecid inhibe la conjugación del Acetaminofén con ácido glucurónico reduciendo su aclaramiento en casi dos veces. Deberá considerarse reducir la dosis de Acetaminofén durante el tratamiento concomitante con probenecid.

- Salicilamida puede prolongar la $t_{1/2}$ de eliminación del Acetaminofén.

- Ha de tenerse precaución con la administración concomitante de inductores enzimáticos o de sustancias potencialmente hepatotóxicas .

- Metoclopramida y domperidona aceleran la absorción del Acetaminofén.

- Colestiramina reduce la absorción del Acetaminofén.

- Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina): La administración durante periodos prolongados de dosis de Acetaminofén superiores a 2 g/día con este tipo de productos, puede provocar un incremento del efecto anticoagulante, posiblemente debido a una disminución de la síntesis hepática de los factores que favorecen la coagulación. Dada su aparente escasa relevancia clínica a dosis inferiores a 2 g/día, se debe considerar como alternativa terapéutica a la administración de salicilatos en pacientes con terapia anticoagulante.

- Alcohol etílico: Potenciación de la toxicidad del Acetaminofén, por posible inducción de la producción hepática de los productos hepatotóxicos derivados del Acetaminofén.

- Anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona): Disminución de la biodisponibilidad del Acetaminofén así como potenciación de la hepatotoxicidad en sobredosis, debido a la inducción del metabolismo hepático.

- Estrógenos: Disminución de los niveles plasmáticos de Acetaminofén, con posible inhibición de su efecto, por posible inducción de su metabolismo.

- Diuréticos del asa: Los efecto de los diuréticos pueden verse reducidos, ya que el Acetaminofén puede disminuir la excreción renal de prostaglandinas y la actividad de la renina plasmática.

**MEDIDA A TOMAR EN CASO DE SOBREDOSIS O TOXICIDAD**
En caso de sobredosificación, llamar inmediatamente a su médico o llevar al paciente al hospital. En los casos donde haya sobredosis, se recurrirá al lavado gástrico, la utilización de n-acetilcisteína.

**ALMACENAMIENTO**
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN**
.Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
.Su venta requiere receta médica.
.Literatura exclusiva para médicos.
.No se use después de su fecha de caducidad.
.Este medicamento cumple con todos los requisitos de la c.G.M.P. y la FDA.

**PRESENTACIÓN**
Caja de 25 sobres por 2 capletas.
Caja de 6 sobres por 2 capletas.

**Elaborado por:**
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana.

Informacion actualizada, junio 2019

A-402510 R.0