Transform®
Orlistat 120 mg

Cápsulas
Liporeductor

COMPOSICION

Orlistat……..120 mg

PROPIEDADES

TRANSFORM es un fármaco destinado a inhibir la absorción de los ácidos grasos, logrando una disminución en la cantidad de calorías, y por consiguiente, resultando en una disminución en el peso corporal.

TRANSFORM ejerce su acción, inhibiendo las lipasas pancreáticas, que son las encargadas de degradar los ácidos grasos (en forma de triglicéridos) y consecuentemente, estos no son absorbidos y son eliminados sin transformación.

INDICACIONES

TRANSFORM está indicado para el tratamiento a largo plazo, junto con una dieta baja en calorías de forma moderada, de pacientes obesos o con sobrepeso.

TRANSFORM logra una disminución en la reducción, mantenimiento y prevención del aumento de peso, acompañándose de una dieta balanceada.

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS
Vía oral

La dosis recomendada, es 1 cápsula de **TRANSFORM** con cada comida (desayuno - almuerzo - cena). Estas pueden ser tomadas durante cada comida ó 1 hora después. Sí los alimentos que se van a ingerir no contienen grasa, puede omitirse la dosis de **TRANSFORM** correspondiente.

Es necesario que el paciente lleve una dieta equilibrada, donde la ingesta de grasas no exceda el 30% de las calorias totales.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

TRANSFORM está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad conocida al orlistat ó cualquiera de los componentes de la fórmula; Así como, en pacientes con síndrome de mal absorción

EFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas más frecuentes observadas con el uso de **TRANSFORM** son: Manchas grasosas, flatulencias con evacuación fecal, urgencia fecal, heces grasosas, aumento en las evacuaciones e incontinencia fecal, dolor y molestias abdominales.

Estas reacciones adversas, por lo general son leves y pasajeras, suelen presentarse al inicio del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han descrito interacciones basadas en estudios específicos de interacciones farmacológicas con los fármacos siguientes: Amitriptilina, atorvastatina, biguanidas, digoxina, fibratos, fluoxetina, losartán, fenitoína, anticonceptivos orales, warfarina, nifedipina, Nifedipina de liberación lenta, sibutramina ni alcohol. No obstante, cuando la warfarina u otros anticoagulantes se asocian al orlistat, deben vigilarse estrechamente los valores del cociente internacional normalizado (INR). Se han registrado disminuciones de la absorción de vitamina D, E y betacaroteno cuando se han administrado simultáneamente con orlistat.

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se recomienda la administración de **TRANSFORM** durante el embarazo y la lactancia.

PRESENTACION

TRANSFORM: Caja conteniendo 3 blíster con 10 cápsulas cada uno.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

•Mantenga éste y todo medicamento fuera del alcance de los niños.

•Consérve a temperatura ambiente no más de 30° C) y en lugar seco.

Su venta requiere prescripción médica.
Vía de administración oral.

LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL.

Magnachem®