Zetri-D®

Cetirizina + Fenilefrina **NF**

Jarabe
Antihistaminico- Antialérgico

COMPOSICIÓN
Cada 5 mL contienen:
Cetirizina 2HCl.....5 mg
Fenilefrina HCl.....10 mg
Vehículo, c.s.p.....5 mL

MECANISMO DE ACCIÓN
ZETRI-D NF es la asociación de un potente antihistamínico de tipo H_1 más un vasoconstrictor.
La cetirizina inhibe la fase "precoz" de la reacción alérgica mediada por la histamina y también reduce la migración de ciertas células como eosinófilos y la liberación de determinados mediadores asociados con la respuesta alérgica tardía.
La fenilefrina es un agonista adrenérgico α-1 a lo cual se deben sus efectos simpaticomiméticos, siendo un vasoconstrictor de acción directa.

INDICACIONES TERAPÉUTICA
ZETRI-D NF está indicado en el tratamiento sintomático de rinitis perenne, rinitis estacional como son: Congestión nasal, lagrimeos, estornudos, prurito.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar en diabéticos, hipertiroideos, glaucoma, hipertrofia prostática, isquemia del miocardio, en casos de arritmias cardiacas y úlcera gástrica, hipertensión. Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática y renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Los simpaticomiméticos deben usarse con precaución en pacientes con hipertensión arterial severa, glaucoma, hipertiroidismo, taquiarritmias, isquemia.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA
No administrar durante el embarazo y lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Ha habido informes ocasionales de efectos secundarios subjetivos, pasajeros, como: somnolencia, dolor de cabeza, mareo, agitación, resequedad en la boca y malestar gastrointestinal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los α-bloqueantes y otros fármacos con actividad α-bloqueante como las fenotiazinas, tioxantinas o el haloperidol antagonizan directamente los efectos de la fenilefrina, propiedad que puede ser utilizada para contrarrestar dosis excesivas de esta.
La atropina bloquea la bradicardia refleja producida por la fenilefrina y potencia sus efectos presores.
Los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) o los fármacos que poseen este tipo de actividad como la furazolidona, el linezolid o la procarbazina pueden prolongar e intensificar los efectos de la fenilefrina. La fenilefrina no se debe administrar durante un tratamiento con IMAOs ni durante los 14 días siguientes a haber discontinuado un tratamiento con estos fármacos. La administración concomitante de fenilefrina con diuréticos puede ocasionar una reducción de la respuesta vasopresora. Cuando se administra la maprotilina con fenilefrina, pueden producirse graves efectos cardiovasculares incluyendo arritmias, hipertensión y/o hiperpirexia. También puede producirse hipertensión si la fenilefrina se administra concomitantemente con oxitocina. La administración de simpaticomiméticos y hormonas tiroideas puede aumentar los efectos respectivos sobre el sistema cardiovascular.

La cetirizina experimenta un metabolismo hepático mínimo y se excreta prácticamente si alterar. Por este motivo, las posibilidades de interacción con otros fármacos parecen ser mínima.
Igualmente puede producirse una somnolencia mayor si la cetirizina se administra con fármacos depresores del sistema nervioso central tales como los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, los agonistas opiáceos, la nalbufina, la pentazocina, el tramadol, las benzodiazepinas, los ansiolíticos y los hipnóticos. Pueden producirse efectos aditivos si se administra cetirizina concomitantemente con fenotiazinas u otros antihistamínicos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIFICACIÓN
Niños de 2 - 6 años: 2.5 mL, 1 vez al día.
Niños de 6 -11 años: 5 - 7.5 mL, 1 vez al día.
Mayores de 12 años y adultos: 10 mL, 1 vez al día.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente a su médico y al hospital más cercano. Induzca el vómito y lavado gástrico seguido de tratamientos de soporte.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar seco y fresco a no más de 30ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Venta bajo receta médica
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN
Caja con frasco de 60 mL + vaso dosificador.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

A-401665 R.2