Aderol®

IBUPROFENO

Capleta

COMPOSICIÓN:

Cada capleta contiene:
Ibuprofeno.....800 mg
Excipientes c.s.p.....1 capleta

Resumen de las características del producto.

Ibuprofeno: Antiinflamatorio no esteroideo con propiedades analgésicas y antipiréticas. Es un fármaco efectivo para el alivio de la fiebre y de los dolores leves a moderados. La eficacia antipirética se ha demostrado plenamente, el ibuprofeno posee un inicio de acción rápido (menor a una hora), con un mayor grado de reducción de la temperatura y una mayor duración del efecto antipirético (seis a ocho horas) que el acetaminofén.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

ADEROL® es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompañados de inflamación significativa como artritis reumatoide leve y alteraciones musculoesqueléticas (osteoartritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.). Se utiliza para el tratamiento del dolor moderado en postoperatorio, en dolor dental, postepisiotomía, dismenorrea primaria, dolor de cabeza y estados febriles.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al ibuprofeno, a los salicilatos o a otros antiinflamatorios no esteroides. Niños menores de 12 años. Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. Reacciones alérgicas a los AINES, úlcera péptica o duodenal, sangrado gastrointestinal o cualquier otro sangrado y antecedente de enfermedad ácido-péptica. Disfunción hepática severa. Tercer trimestre de embarazo. Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina < 30 mL/min). Falla cardiaca severa. Cirugía de derivación arterial coronaria (bypass coronario).

REACCIONES SECUNDARIAS

Intolerancia gastrointestinal, más comunes: epigastralgias, náuseas, pirosis, sensación de plenitud en tracto gastrointestinal, la pérdida oculta de sangre es infrecuente. Otras reacciones secundarias menos frecuentes son: trombocitopenia, erupciones cutáneas, cefalea, mareos y visión borrosa, en algunos casos se presentó ambliopía tóxica, retención de líquidos y edema. Se aconseja la suspensión del fármaco en los pacientes que presentan alteraciones oculares. Otros efectos reportados con el uso de ibuprofeno son diarrea, constipación; en pacientes asmáticos se ha reportado obstrucción de vías respiratorias por la retención de líquidos, puede presentarse una insuficiencia cardiaca congestiva o edema pulmonar en enfermos con función cardiaca límite.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con acetaminofén puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos. La administración junto con corticoides o alcohol aumenta el riesgo de efectos gastrointestinales secundarios. El uso concomitante con hipoglucemiantes orales o insulina puede aumentar el efecto hipoglucémico de estos. La asociación con probenecid puede disminuir su excreción y aumentar la concentración sérica potenciando su eficacia o aumentando el potencial de toxicidad.

El ibuprofeno puede reducir el efecto cardioprotector del ácido acetilsalicílico, incrementa las concentraciones plasmáticas de litio, metotrexato y glicósidos cardiacos. El riesgo de nefrotoxicidad se puede incrementar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ciclosporina, tacrolimus o diuréticos, puede reducir el efecto antihipertensivo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores y diuréticos. Puede incrementar el efecto de la fenitoína y las sulfonilureas. No debe administrarse con otros antiinflamatorios no esteroideos.

Vía de administración: Oral.

POSOLOGÍA

Salvo criterio médico

Solamente para uso ocasional, durante periodos limitados. Se debe utilizar la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo necesario para aliviar los síntomas.

En general, se recomiendan dosis de 200 a 800 mg cada 6 a 8 horas (máximo 3.200 mg/día en dosis fraccionadas).

En niños la dosis recomendada es de 10 mg/kg/dosis cada 8 horas, vía oral.

Forma de administración:
Tomar **ADEROL®** con comida o leche para reducir el malestar estomacal. Las capletas deben tragarse con ayuda de un vaso de agua, sin masticar, machacar o chupar para evitar molestias en la boca e irritación de garganta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Utilizar con precaución en pacientes ancianos, en pacientes con insuficiencia renal o hepática, en pacientes con insuficiencia cardiaca y en pacientes con alteraciones de la hemostasia. No administrar asociado a ácido acetilsalicílico. Vigilar el estado de hidratación del paciente ya que puede desencadenar fracaso renal agudo en pacientes deshidratados.

Embarazo y lactancia
Categoría C (primer trimestre): El ibuprofeno, incluido en esta categoría sólo debe utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican los posibles riesgos para el feto.

Categoría D (segundo y tercer trimestre): Existe evidencia de riesgo para el feto basada en datos de investigación, datos post-comercialización, registros de reacciones adversas o estudios en humanos, aunque los beneficios potenciales de su uso en mujeres embarazadas pueden ser aceptables a pesar de los riesgos probables en algunas situaciones.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN:
Los pacientes que presentan alteraciones oculares por el empleo de ibuprofeno aún a dosis terapéuticas deberán suspender de inmediato su uso; en caso de ingesta accidental o voluntaria de sobredosis se aconseja hacer vaciamiento gástrico, administración de sustancias alcalinas que lo neutralicen, ya que es un ácido, y valorar la administración de carbón activado para evitar la absorción del fármaco. Además de monitorear al paciente y mantenerlo bajo observación continua.

PRESENTACIÓN:
Caja con 6 y 50 sobres x 2 capletas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
No se deje al alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

A-XXXXXX R.0

Magnachem
Salud y Vida