BROCOCHEM AS

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene:

Cetirizina diclorhidrato……..…2.5mg
Fenilefrina HC……..…….10.0mg
Acetaminofén……..325.0mg
Excipiente, c.s.p……..1 cápsula

Cada 5mL contiene:

Cetirizina diclorhidrato……...2.5mg
Fenilefrina HCl……5.0mg
Acetaminofén……...325.0mg
Vehículo, c.s.p……....5mL

INDICACIONES:

Analgésico, antipirético, para el tratamiento sintomático de rinofaringitis, la sinusitis y de los síntomas provocados por las infecciones respiratorias altas de etiología viral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: *Oral.*

POSOLOGÍA:
Cápsulas: Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar por vía oral 1 cápsula cada 8 horas.
Jarabe: Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 2 cucharaditas del jarabe cada 12 horas.
Niños menores de 6 años: Bajo prescripción médica, una cucharadita de jarabe cada 12 horas.
La dosis total de acetaminofén no debe sobrepasar los 80mg/kg/día para niños con un peso menor de 37kg y 3g al día en adultos y niños con más de 38kg.
Si luego de tres días persisten los síntomas, acuda a su médico a la unidad de salud más cercana.

CONTRAINDICACIONES:
Afecciones cardiacas severas, hipertiroidismo, hipertensión.
Hipersensibilidad a los componentes, pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO).

ADVERTENCIAS:
Puede producir hepatotoxicidad, incluso a dosis terapéuticas, después de un corto período de tratamiento, aún en pacientes sin insuficiencia hepática.
Se recomienda no administrar durante el embarazo y la lactancia a no ser que, según criterio médico, los beneficios sean mayores que los riesgos.

PRECAUCIONES:
Usar con precaución en pacientes con glaucoma, disfunción hepática o renal, dependencia al alcohol, deshidratación o malnutrición crónica... En caso de sentir somnolencia,se recomienda no conducir vehículos o maquinarias pesadas. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, sedantes o tranquilizantes de manera concomitante.

REACCIONES ADVERSAS:
Acetaminofén: son raras : angioedema, desorientación, mareo, rash maculopapular pruriginoso, síndrome de Stevens-Johnson, urticaria, agranulocitosis, hepatotoxicidad, , nefrotoxicidad,
Cetirizina: somnolencia, cefalea, fatiga, boca seca, mareo, dolor abdominal, diarrea, vómito. Fenilefrina: palpitaciones, taquicardia, cefalea, palidez, temblor, hipertensión.

INTERACCIONES:
No asociar con medicamentos antihipertensivos, porque éstos pueden perder su efecto.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Una sobredosis importante puede provocar un aumento de somnolencia, sensación de fatiga, síntomas de depresión e irregularidades del ritmo cardiaco que puede llegar hasta inconsciencia o, al contrario, estimulación con insomnio, alucinaciones, temblores y crisis epilépticas.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén. Deberá inducirse el vómito si éste no se ha producido espontáneamente y el paciente se encuentra despierto. Se recomienda lavado gástrico.

PRESENTACIÓN:
Cápsulas:
Caja con 6 sobres por 2 cápsulas.
Caja con 25 sobres por 2 cápsulas.
Jarabe: Caja conteniendo frasco por 120 mL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Cápsulas: Almacenar a temperatura no mayor de 30ºC).
Jarabe: Mantener a una temperatura entre 20-25°C (66-77°F). No use este producto si la tapa de seguridad está rota.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Venta sin receta médica.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana