Dolac® gel

Dexketoprofeno trometamol

Gel

COMPOSICIÓN
Cada gramo contiene:
Dexketoprofeno trometamol
Equivalente a Dexketoprofeno.....12.5 mg
Excipientes c.s.p.....1 g

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antiinflamatorio - Analgésico.
Código ATC: M02AA96.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Dolac® gel está indicado en afecciones dolorosas, inflamatorias, de origen traumático o degenerativo de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Tópica.

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico
Dolac® gel debe aplicarse en la piel del área dolorosa o inflamada, 2 - 3 veces al día, con ayuda de un masaje que dure unos 3-5 minutos. La cantidad de gel debe ajustarse a que cubra el área dolorosa. El tubo debe cerrarse después de su uso. Se recomienda lavarse las manos después de la aplicación.
La duración de tratamiento continuo no debe extenderse por más de 7 días.
Uso en niños: No se han establecido aún las dosis ni las indicaciones recomendadas para niños menores de 6 años.

CONTRAINDICACIONES
No debe usarse en aquellos pacientes que hayan mostrado previamente hipersensibilidad al dexketoprofeno o al ketoprofeno en cualquiera de sus presentaciones.
Existe la posibilidad de una hipersensibilidad cruzada con el ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No exponer la piel de la zona tratada a la luz solar directa después de la utilización del gel. Si el uso de **Dolac® gel** produce irritación local, debe suspenderse su administración e instaurar la terapia adecuada.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: No se ha establecido la seguridad de dexketoprofeno en mujeres embarazadas por lo que debe evitarse su administración durante el embarazo.
Lactancia: No hay suficientes datos sobre la excreción del dexketoprofeno en la leche humana, por lo que no se recomienda su administración a mujeres en periodo de lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Las interacciones con otros medicamentos son improbables ya que las concentraciones séricas que se alcanzan con la administración tópica son muy bajas.

REACCIONES ADVERSAS
En pacientes especialmente sensibles, el producto puede producir una reacción local con picor y/o enrojecimiento de la piel, que desaparece al suspender el tratamiento. En raras ocasiones esta reacción puede aparecer si el paciente expone a la luz solar directa la zona en la que se ha aplicado el gel.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Al tratarse de un preparado tópico, la posibilidad de sobredosificación es remota.
Si se produjera la ingestión accidental del contenido del tubo se deberá realizarse un lavado gástrico y a la instauración de tratamiento sintomático. El dexketoprofeno se elimina mediante diálisis.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo tubo de 30 gramos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
No se use después de su fecha de caducidad.
No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, agosto 2023.

A-402919 R.1