Movix® DUO

Meloxicam + Glucosamina Sulfato

Gránulos para solución oral

Magnachem® Salud y Vida

COMPOSICIÓN
Cada sobre contiene:
Glucosamina Sulfato Cloruro de Potasio Eq. a Glucosamina Sulfato..…….. 1,500 mg
Meloxicam Micronizado …… 15 mg
Excipientes, c.s.p. …….. 1 sobre

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antinflamatorio no esteroide y Antirreumático, código ATC M01AC56.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Está indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo de la artrosis y las diferentes formas de reumatismos extraarticulares.

VIA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

POSOLOGÍA
Salvo criterio médico
1 sobre diluido en un vaso de agua, una vez al día, con el desayuno. El tratamiento es de corto plazo y su duración debe estar de acuerdo con las metas terapéuticas individuales para cada paciente.
Instrucciones de preparación: disolver el contenido de un sobre en un vaso con 250 mL de agua hervida o purificada, tomar preferiblemente en la mañana.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los principios activos.
No administrar **Movix® DUO** a pacientes con alergia al marisco, ya que la glucosamina se obtiene a partir de crustáceos.
Pacientes con úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia hepática o renal severa. Pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad al fármaco o asma, angioedema, urticaria o cualquier reacción relacionada a los antiinflamatorios no esteroidales (AINE).
Hemorragia gastrointestinal, antecedentes de hemorragia cerebrovascular u otros trastornos hemorrágicos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
En pacientes con factores de riesgo cardiovascular conocidos se recomienda monitorizar los niveles de lípidos en sangre, ya que se han observado casos de hipercolesterolemia en pacientes tratados con glucosamina.
En pacientes con intolerancia a la glucosa alterada se monitorizarán los niveles de glucosa y, cuando proceda, las necesidades de insulina, antes del tratamiento y periódicamente durante el mismo.
Tras el inicio de la terapia con glucosamina, se han descrito síntomas de asma exacerbados, que desaparecen tras retirar el tratamiento. Estos pacientes deberán, por lo tanto, ser conscientes del posible empeoramiento de sus síntomas cuando inicien tratamiento con glucosamina.
No se ha establecido ni la seguridad ni la eficacia en niños y jóvenes menores de 18 años, razón por la cual debe evitarse la administración en estos pacientes.
Movix® DUO debe ser administrado con precaución en pacientes con antecedentes de dolencias gastrointestinales o que beben anticoagulantes orales. En pacientes con insuficiencia renal o que se encuentren sometidos a hemodiálisis.
El riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es mayor con el incremento de las dosis de AINE, en pacientes con antecedentes de úlcera, particularmente si se complica con hemorragia o perforación y en pacientes de edad avanzada.
Durante la terapia prolongada se recomiendan recuentos hemáticos. Pueden ocurrir reacciones alérgicas, incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides, incluso sin una exposición previa a la droga.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Embarazo: contraindicado durante el embarazo.
Lactancia: no se recomienda la administración en mujeres en fase de lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los pacientes tratados con antagonistas orales de la vitamina K deben ser vigilados de cerca en el momento del inicio o de la finalización del tratamiento con glucosamina.
El tratamiento simultáneo de glucosamina con tetraciclinas puede incrementar la absorción y concentraciones séricas de las tetraciclinas, pero la relevancia clínica de esta interacción es probablemente limitada.
Debido a la limitada documentación disponible sobre posibles interacciones medicamentosas con glucosamina, se debe estar alerta ante un cambio en la respuesta o concentración de medicamentos que se administren simultáneamente.
Efecto sinérgico con: otros AINE, incluyendo ácido acetilsalicílico.
Riesgo aumentado de hemorragia con: anticoagulantes orales, trombolíticos y antiagregantes plaquetarios.
Reduce el efecto de: diuréticos y otros antihipertensivos.
Disminuye efecto antihipertensivo de: ß-bloqueantes.
Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina, tacrolimús.
Disminuye eficacia de: dispositivos intrauterinos. Incrementa toxicidad de: litio, metotrexato (> de 15 mg/semana, no recomendable, dosis inferiores monitorizar el hemograma y la función renal).
Eliminación acelerada por: colestiramina.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas que a continuación se describen se han clasificado atendiendo a la frecuencia de aparición:
Frecuentes: cefalea, somnolencia, diarrea, estreñimiento, náuseas, flatulencia, dolor abdominal, dispepsia, cansancio.
Poco frecuentes: sofocos, eritema, picor, rash, anemia, mareo, vértigo, aumento de la presión arterial, hemorragias gastrointestinales ocultas o macroscópicas, estomatitis, gastritis, eructos.
Raras: recuento celular sanguíneo alterado, alteraciones del estado de ánimo, pesadillas, alteraciones.
Muy raras: agranulocitosis, hepatitis, insuficiencia renal aguda especialmente en pacientes con factores de riesgo.
Frecuencia no conocida: reacciones alérgicas (hipersensibilidad), insomnio, asma/ asma agravada, elevación de las enzimas hepáticas, aumento de la glucosa sanguínea.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Los signos y síntomas producidos por una sobredosis pueden incluir cefalea, náuseas, vómitos, diarrea o constipación, letargia, somnolencia, dolor epigástrico. Se puede producir hemorragia gastrointestinal.
Una intoxicación grave puede producir hipertensión, fallo renal agudo, disfunción hepática, depresión respiratoria, coma, convulsiones, colapso cardiovascular y parada cardiaca. Se han observado reacciones anafilactoides con la administración terapéutica de AINE y puede ocurrir con una sobredosis.
En caso de sobredosis, el tratamiento debe ser suspendido y deben adoptarse las medidas de soporte necesarias, como por ejemplo acciones para restaurar el equilibrio hidroelectrolítico.
En un estudio clínico se demostró la eliminación acelerada de meloxicam al administrar 4 g de colestiramina por vía oral tres veces al día.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 30 sobres de 4 g.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30 ºC.
Proteger de la luz y la humedad.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
No se use después de su fecha de caducidad.
No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:
Laboratorio Magnachem International, SRL.
República Dominicana

Información actualizada, julio 2024